

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и
претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации
по специальности «Сестринское дело»
для подготовки к тестовому контролю знаний –
1 этапа специального экзамена

г. Новосибирск
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации при проведении 1 этапа специального экзамена – тестирование.

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» представлены типовые тестовые задания первого уровня (на выбор одного или двух-трех правильных ответов) по всем профессиональным модулям с учетом профессиональных компетенций, которые введены в компьютерную программу тестирования. Тестовые задания представлены только в закрытой форме. При выполнении задания от вас требуется проанализировать верный ответ. Ответ на задание превращается в законченное утверждение. Ваши ответы на тестовые задания вы можете сверить с правильными ответами предложенных эталонов

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования Федерального государственного образовательного стандарта по специальности.

Для специалистов сформированы до 600 тестовых заданий

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 100 тестов. На работу с тестом отводится 100 мин.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение аттестуемым тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов

01. ПМ 01. Проводить профилактические мероприятия

01.02. ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

1. Выберите правильный вариант ответа

Для борьбы с гиподинамией можно

- Начать соблюдать диету
- Дважды в день принимать контрастный душ
- Увеличить двигательную активность
- Прочитать книги по гимнастике и йоге.

2. Выберите правильный вариант ответа

Расшифруйте аббревиатуру ИППП

- Исследование полноценности питания пациента
- Инерция проводимости пучков Перельмана
- Инфекции, передающиеся половым путем
- Инервация передней половины поджелудочной

3. Выберите 1 правильный вариант ответ

Висцеральный жир опасен тем, что

- Выделяет в кровь гормоны и жирные кислоты
- Производит негативное впечатление на окружающих

Приводит к задержке жидкости

Уменьшает потребность в пище

4. Выберите правильный вариант ответа

Главная цель модернизации здравоохранения РФ - это

- Сделать профилактические мероприятия дешевле
- Укрупнить лечебно-профилактические учреждения
- Увеличить количество медицинских работников
- Повысить доступность и качество медицинской помощи

5. Выберите правильный вариант ответа

Репродуктивное здоровье - это

- Способность организма воспроизводить клетки органов и систем

Показатель эффективности усвоения продуктов питания в процессе пищеварения

Состояние физического, психического и нравственного благополучия, которое позволяет родить здорового ребенка.

Термин, обозначающий совокупность половых признаков

6. Выберите правильный вариант ответа

Липопротеиды низкой плотности – это

- Низкий уровень сахара
- Плотный уробилин
- Холестерин, который формирует атеросклеротические бляшки
- Элементы крови

7. Выберите правильный вариант ответа

Целевой уровень липопротеидов низкой плотности – это

- Калорийность питания
- Правильный режим питания
- Достаточная доля белков в рационе

Нормальное количество холестерина для определенного возраста

8. Выберите правильный вариант ответа

Опросник Audit позволяет мед.сестре за 15 мин

- Определит основные показатели здоровья
- Выявить наследственные факторы риска
- Выявить склонность к алкоголизму
- Определить уровень знаний в вопросах сохранения здоровья

9. Выберите правильный вариант ответа

Какова цель ЗОЖ

- Профилактика ХНИЗ, дающих самую высокую смертность
- Уменьшение расходов на здравоохранение и нагрузки медицинских специалистов
- Повышение уровня культуры и нравственности граждан
- Выполнение международных обязательств нашей страны

10. Выберите правильный вариант ответа

ЗОЖ - это

- Значимые основы жизни
- Запланированные определения жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни
- Законные основы жизнеустройства

11. Выберите правильный вариант ответа

Цель системы гигиенического воспитания и образования населения

- уменьшение негативного влияния маргинальных слоев на остальное общество
- формирование гигиенической культуры и мотивации к здоровому образу жизни
- создание единой нормы поведения у всех граждан
- Определит основные показатели здоровья

12. Выберите правильный вариант ответа

Кабинеты здоровья и диспансеризация нужны, для того чтобы

- Обязать работающее население следить за своим здоровьем
- Заставить работодателей выполнять социальные гарантии
- Определит основные показатели здоровья
- Выявить потенциальные угрозы здоровью, обнаружить скрытые заболевания

13. Выберите правильный вариант ответа

Выберите биологические модифицируемые факторы риска

- Артериальная гипертензия
- Дислипидемия
- Гиперинсулинемия
- Все ответы верны

14. Выберите правильный вариант ответа

Перечислите «врагов» здорового питания

- Избыток сахара
- Чипсы
- Усилители вкуса
- Все перечисленное

15. Выберите правильный вариант ответа

Последствиями гиподинамии являются

- Хроническая апатия
- Анемия
- Накопление висцерального жира
- Адинамия

16. Выберите правильный вариант ответа

Контроль самочувствия после физической нагрузки состоит в

- Подсчет ЧДД и измерение АД
- Подсчет PS и ЧДД
- Подсчет PS сразу, через 15 секунд и через 30 сек
- Подсчет PS и измерение АД

17. Выберите правильный вариант ответа

«Школа здоровья» (Школа пациента) нужна, чтобы

- Углубить знания и привить навыки ЗОЖ
- Углубить знания и обучить самоконтролю
- Углубить знания, обучить самоконтролю и привить навыки ЗОЖ
- Обучить самоконтролю, привить навыки ЗОЖ

18. Выберите правильный вариант ответа

Какие из перечисленных видов относятся к барьерным методам контрацепции

- Спермициды
- Стерилизация
- Мужские и женские презервативы
- Гормональные препараты

19. Выберите правильный вариант ответа

Диспансеризация – это

- Сбор анамнеза
- Инструментальное обследование
- Основной метод раннего выявления основных заболеваний

Комплексное обследование, достаточное для полной диагностики

20. Выберите правильный вариант ответа

ВОЗ определяет здоровье как

- Отсутствие болезней
- Нормальная физическая и психическая жизнь
- Отсутствие физических дефектов
- Состояние полного благополучия

21. Выберите правильный вариант ответа

Индекс курения это

- Число сигарет x 8
- Число сигарет x 5
- Число сигарет x 10
- Число сигарет x 12

22. Выберите правильный вариант ответа

Главная опасность активного курения – это

- Изменение цвета лица
- Язвенная болезнь желудка
- Хронические заболевания легких
- Обильная саливация

23. Выберите правильный вариант ответа

Целевой уровень сахара крови натощак

- 4,5 ммоль/л
- 5,0 ммоль/л
- 5,5 ммоль/л
- 3,0 ммоль/л

24. Выберите правильный вариант ответа

Диспансеризация – это

- Детальное обследование
- Лечение
- Тщательный осмотр
- Один из методов профилактики

25. Выберите правильный вариант ответа

Гиподинамия – это

- Недостаток сахара в крови
- Недостаток холестерина
- Малоподвижный образ жизни

01.03. ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и окружения.

26. Выберите правильный вариант ответа

Краткость проведения медицинской сестрой
дородового патронажа беременной

- 1
- 2
- 3
- 4

27. Выберите правильный вариант ответа

Патронаж здорового новорожденного
осуществляется медицинской сестрой

- 1 раз в неделю
- 2 раза в неделю
- 1 раз в месяц

2 раза в месяц

28. Выберите правильный вариант ответа

Патронаж детей в возрасте от 1 до 2 лет
осуществляется медицинской сестрой

- 1 раз в месяц
- 1 раз в 2 месяца
- 1 раз в 3 месяца
- 1 раз в 6 месяцев

29. Выберите правильный вариант ответа

Здоровые дети с нормальным физическим и
нервно-психическим развитием, не имеющим
хронической патологии, относятся к группе
здоровья

- 1
- 2
- 3
- 4

30. Выберите правильный вариант ответа

Дети с хронической патологией в стадии компенсации относятся к группе здоровья

- 2
- 3
- 4
- 5

31. Выберите правильный вариант ответа

Дети с тяжелыми врожденными пороками развития или тяжелой хронической патологией в стадии декомпенсации относятся к группе здоровья

- 2
- 3
- 4
- 5

32. Выберите правильный вариант ответа

Карта профилактических прививок – это форма

- ф-75а
- ф-030
- ф-063
- ф-112

33. Выберите правильный вариант ответа

История развития ребенка – это форма

- ф-112
- ф-114
- ф-116
- ф-286

34. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность периода внутриутробного развития составляет (в неделях беременности)

- 18
- 24
- 32
- 40

35. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность периода новорожденности составляет (в мес.)

- 1
- 4
- 6
- 12

36. Выберите правильный вариант ответа

Ребенок начинает держать голову в возрасте (в мес.)

- 2
- 4
- 6
- 8

37. Выберите правильный вариант ответа

Ребенок начинает самостоятельно сидеть в возрасте (мес.)

- 2-4

4-5

6-7

8-9

38. Выберите правильный вариант ответа

При заболеваниях у детей подкожно-жировой слой уменьшается вначале в области

- лица
- рук
- ног
- живота

39. Выберите правильный вариант ответа

Форма большого родничка у новорожденного

- овальная
- округлая
- треугольная
- ромбовидная

40. Выберите правильный вариант ответа

Большой родничок у новорожденного располагается между костями черепа

- лобной и теменными
- теменными
- затылочной и теменными
- височной и теменной

41. Выберите правильный вариант ответа

Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте (в мес.)

- 2-3
- 3-4
- 6-7
- 8-10

42. Выберите правильный вариант ответа

У новорожденных отмечается физиологическая

- гипертония мышц-разгибателей
- гипертония мышц-сгибателей
- гипотония мышц-сгибателей
- нормотония мышц

43. Выберите правильный вариант ответа

Большой родничок у ребенка закрывается в возрасте (мес.)

- 4-6
- 7-11
- 12-15
- 15-20

44. Выберите правильный вариант ответа

Количество молочных зубов у ребенка 1 года, рассчитанное по формуле

- 4
- 6
- 8
- 12

45. Выберите правильный вариант ответа

Частота дыхательных движений у доношенного новорожденного (в 1 мин.)

- 20-30
- 30-40

- 40-50
- 50-70

46. Выберите правильный вариант ответа

Частота пульса у доношенного новорожденного (в 1 мин.)

- 80-120
- 100-120
- 120-140
- 140-180

47. Выберите правильный вариант ответа

Формула $100+n$ (n- лет) применяется у ребенка старше 1 года для расчета

- систолического АД
- диастолического АД
- пульсового давления
- дефицита пульса

48. Выберите правильный вариант ответа

Формула для определения количества молочных зубов у ребенка в возрасте 6-24 мес. (n-число месяцев)

- n-1
- n-2
- n-3
- n-4

49. Выберите правильный вариант ответа

Смена молочных зубов на постоянные начинается у ребенка в возрасте (лет)

- 2-4
- 5-7
- 7-10
- 10-13

50. Выберите правильный вариант ответа

Емкость мочевого пузыря у ребенка 1 года составляет (в мл.)

- 50
- 100
- 150
- 200

51. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность периода новорожденности составляет (в мес.)

- 1
- 4
- 6
- 12

52. Выберите правильный вариант ответа

Ребенок начинает держать голову в возрасте (в мес.)

- 2
- 4
- 6
- 8

53. Выберите правильный вариант ответа

Ребенок начинает самостоятельно сидеть в возрасте (мес.)

- 2-4

- 4-5

- 6-7

- 8-9

54. Выберите правильный вариант ответа

Особенности ЖКТ в пожилом возрасте

- потеря зубов
- укорочение пищевода
- усиление перистальтики
- увеличение количества желудочного сока

55. Выберите правильный вариант ответа

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы в пожилом возрасте

- увеличение массы почек
- уменьшение уровня почечного кровотока
- увеличение растяжимости мочевого пузыря
- олигурия

56. Выберите правильный вариант ответа

Признаки изменения зрительного анализатора

- учащение мигания
- пучеглазие
- увеличение способности аккомодации хрусталика
- тусклость конъюнктивы

57. Выберите правильный вариант ответа

Признаки старения мочевыделительной системы

- увеличение массы почек
- увеличение почечного кровотока
- никтурия
- задержка мочи

58. Выберите правильный вариант ответа

Биологическая смерть – это

- остановка дыхания
- прекращение деятельности мозга
- остановка сердца
- понижение давления

59. Выберите правильный вариант ответа

Возрастные изменения кожи

- увеличение тактильной чувствительности
- снижение болевой, температурной, тактильной чувствительности
- увеличение болевой чувствительности
- повышение болевой, температурной, тактильной чувствительности

60. Выберите правильный вариант ответа

Атрофия слизистой ведет к

- повышению секреции
- сухости
- разрастанию эпителия
- потливости

61. Выберите правильный вариант ответа

Старение – это

- биологический процесс
- следствие вредных привычек
- восстановительный процесс
- период жизни

62. Выберите правильный вариант ответа

Долгожители – это люди в возрасте (годы)

- 60-75
- 75-80
- 80-85
- старше 90

63. Выберите правильный вариант ответа

Пожилые – это люди в возрасте (годы)

- 45-59
- 60-74
- 75-80
- старше 90

64. Выберите правильный вариант ответа

Старческий возраст (годы)

- 45-59
- 60-74
- 75-89
- более 90

65. Выберите правильный вариант ответа

Оптимальная температура воздуха в помещении для человека старческого возраста (С0)

- 14-18
- 18-20
- 22-23
- 28-30

66. Выберите правильный вариант ответа

Типичная физиологическая проблема лиц пожилого и старческого возраста

- потливость
- сонливость
- запоры
- острая задержка мочи

67. Выберите правильный вариант ответа

Типичная психосоциальная проблема лиц пожилого и старческого возраста

- одиночество
- злоупотребление алкоголем
- склонность к суициду
- отказ от участия в общественной жизни

68. Выберите правильный вариант ответа

Рацион пожилого и старческого человека предусматривает ограничение

- белков животного происхождения
- белков растительного происхождения
- жиров животного происхождения
- жиров растительного происхождения

69. Выберите правильный вариант ответа

Рекомендуемое суточное количество жидкости в старости (л)

- 0,8-1
- 1-1,5
- 1,5-2
- 2-2,5

70. Выберите правильный вариант ответа

Первая менструация у девочек начинается в норме в возрасте (годы)

- 8-10
- 12-13
- 16-17
- 20-22

71. Выберите правильный вариант ответа

Органы репродуктивной системы женщины

- яичники, матка, маточные трубы, влагалище
- влагалище, матка, мочевого пузыря, яичники
- матка, яичники, прямая кишка, влагалище
- яичники, уретра, матка, маточные трубы

72. Выберите правильный вариант ответа

Одно из наиболее частых последствий абортов, ведущее к разводу

- неправильное положение матки
- нарушение менструального цикла
- бесплодие
- многоплодная беременность

73. Выберите 2 варианта ответа

Функции кожи, хорошо выраженные в детском возрасте

- защитная
- дыхательная
- терморегуляционная
- осязательная

74. Выберите 2 варианта ответа

Кожа новорожденного

- тонкая
- толстая
- легкоранимая
- хорошо защищает ребенка

75. Выберите 2 варианта ответа

Профилактика костных деформаций в детском возрасте

- жесткий матрас
- мягкий матрас
- правильный подбор мебели по росту
- переноска ребенка в «кенгуру»

76. Выберите 2 варианта ответа

Кожные складки новорожденного обрабатывают

- растительным маслом
- 5 % р-ом йода
- детским кремом
- 1 % р-ом бриллиантовой зелени

77. Выберите 2 варианта ответа

Профилактика сколиоза и сутулости у детей

- жесткий матрас
- плавание
- тяжелая атлетика
- компьютерные игры

78. Выберите 2 варианта ответа

Дыхание грудного ребенка

- частое
- редкое
- поверхностное
- глубокое

79. Выберите 2 варианта ответа

Причины физиологической желтухи новорожденных

- массивный распад эритроцитов
- массивный распад лейкоцитов
- незрелость печени
- незрелость почек

80. Выберите 2 варианта ответа

Проявление полового криза новорожденных

- гипертермия
- набухание молочных желез
- отек мошонки
- рвота
- понос

81. Выберите 2 варианта ответа

Восьмимесячный здоровый ребенок

- хорошо ползает
- бегают
- говорит 5-6 слов
- стоит, держась за опору
- называет цвета

82. Выберите 2 варианта ответа

Наружные половые органы женщины

- влагалище
- маточные трубы
- клитор
- молочные железы
- большие и малые половые губы

01.03. ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

83. Выберите правильный вариант ответа

Первичная профилактика

- медицинские услуги в поликлинике
- вид доврачебной помощи
- комплекс методов, направленных на предотвращение заболеваний и сохранение благополучия
- медицинские услуги в стационаре

84. Выберите правильный вариант ответа

Существуют три вида профилактики

- простая, промежуточная, высокой сложности
- первичная, вторичная, третичная
- сестринская, фельдшерская, врачебная
- сестринская, стоматологическая

85. Выберите правильный вариант ответа

Профилактика рака молочной железы - это

- Осмотр терапевта 1 раз в квартал
- Ежегодная флюорография
- Маммография 1 раз в год
- Использование корректирующего белья

86. Выберите правильный вариант ответа

Типы профилактики

- специфическая и неспецифическая
- краткосрочная и пролонгированная
- узконаправленная и универсальная
- сестринская, фельдшерская, врачебная

87. Выберите правильный вариант ответа

Цель вторичной профилактики

- Предотвращение осложнений, если заболевание уже возникло
- Использование препаратов второго ряда
- Реабилитация реконвалесцентов в санаторно-курортных условиях
- Консультирование родственников заболевших

88. Выберите правильный вариант ответа

Кодексы здоровья и долголетия (КЗИД)

разработаны для всех целевых групп, кроме

- Подростков
- Пожилых людей
- Беременных женщин
- Молодых мужчин

89. Выберите правильный вариант ответа

Уровень «С» - реактивного белка говорит о

- Обострении хронического гепатита
- Глистной инвазии
- Тяжелом остеохондрозе
- О риске инфаркта и инсульта

90. Выберите правильный вариант ответа

Мед сестра-специалист кабинета доврачебной практики должна определить у пациента

- Вес +рост +цифры сахара крови
- ИМТ +цифры холестерина крови
- АД +цифры сахара крови
- ИМТ+АД +цифры сахара и холестерина

01.03. ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний

91. Выберите правильный вариант ответа

Классический пример вакцины для внутрикожного введения

- БЦЖ
- живая полиомиелитная вакцина
- противогриппозная вакцина
- против гепатита В

92. Выберите правильный вариант ответа

Кожу в месте введения вакцины обрабатывают

- 90% этиловым спирто
- 70% этиловым спиртом
- камфорным спиртом
- сухим стерильным тампоном

93. Выберите правильный вариант ответа

Угол введения внутримышечной инъекции

- 30 °С

45 °С

60 °С

90 °С

94. Выберите правильный вариант ответа

Перенос (перевоз) вакцины совершается в специальных термо-контейнерах с применением

вакуумной изоляции

подогрева

хладоэлемента

системы вентиляции

95. Выберите правильный вариант ответа

В прививочном кабинете вакцина хранится в

сейфе

холодильнике

шкафу

столе

96. Выберите правильный вариант ответа

Абсолютное противопоказание для введения всех вакцин

нежелание пациента

сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение

однократная аллергическая реакция в анамнезе на цветение тополя

остаточный кашель после ОРВИ

97. Выберите правильный вариант ответа

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок утвержден

приказом министерства Здравоохранения и социального развития РФ № 455

приказом министерства Здравоохранения и социального развития РФ № 302

Постановлением Правительства РФ № 825

98. Выберите правильный вариант ответа

При вакцинации пациент осматривается врачом

за несколько дней до прививки

в день прививки

накануне вечером

в течение месяца

99. Выберите правильный вариант ответа

С профилактической целью вакцинация производится

по решению врача

по желанию пациента

по распоряжению главного врача

по распоряжению министерства

100. Выберите правильный вариант ответа

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи устанавливается

местными органами управления здравоохранения

губернатором области (района)

страховой компанией

главным врачом ЛПУ

101. Выберите правильный вариант ответа

Основной документ поликлиники

устав

амбулаторная карта пациента

декларация прав

диспансерная карта учета

102. Выберите правильный вариант ответа

Количество населения на взрослом терапевтическом участке (человек)

1200

1700

2000

2500

103. Выберите правильный вариант ответа

Объем помощи, оказываемой в системе ПМСП устанавливается

местной администрацией

Министерством здравоохранения и социального развития РФ

страховой компанией

главным врачом ЛПУ

104. Выберите 2 варианта ответа

Преимущества интраназального способа введения вакцин

не требуется специального образования и подготовки

точность введенной дозы

низкая антигенная нагрузка

создается отличный иммунитет на слизистых оболочках верхних дыхательных путей

105. Выберите 2 варианта ответа

К факторам, располагающим к поствакцинальным осложнениям, относятся

любые формы аллергических проявлений

страх пациента

наличие в прошлом ненормальных реакций на предшествующие прививки

наличие хронических заболеваний в стадии ремиссии

наличие хронических заболеваний

106. Выберите 2 варианта ответа

Сильной реакцией на введение вакцины считается

наличие температуры тела 40°С и выше

температура тела до 38°С

в месте введения вакцины — отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре

гиперемия в месте введения вакцины до 2 см в диаметре

развитие гипертонического криза

107. Выберите 2 варианта ответа

В понятие амбулаторно-поликлинической помощи входят

доврачебная помощь

социальная помощь

первая врачебная помощь

помощь малоимущим гражданам

108. Выберите 2 варианта ответа

Основные задачи участковой медицинской сестры

выполнение лечебных и диагностических

назначений врача в поликлинике и на дому

организация работы регистратуры

проведение профилактических и санитарно-просветительных мероприятий среди населения участка

организация работы кабинета доврачебного приема

109. Выберите 2 варианта ответа

Отделение медицинской профилактики осуществляет виды профилактик

первичную

нетрадиционную

вторичную

третичную

акупунктурную

02. ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

02.01. ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде

110. Выберите правильный вариант ответа

Потенциальная проблема пациента при бруцеллезе

риск развития удушья

риск инвалидизации по опорно - двигательной системе

риск потери зрения

риск развития пневмонии

111. Выберите правильный вариант ответа

Тактика медицинского персонала при эпидемии

гриппа в школе

работа в обычном режиме

выступление по школьному радио с беседой на тему: "Грипп, пути передачи, клиника и профилактика"

контроль пищеблока

проветривание помещений

112. Выберите правильный вариант ответа

Специфическая профилактика гриппа

приём дибазола

прием аскорбиновой кислоты в больших дозах

прием «Антигриппина»

вакцинация

113. Выберите правильный вариант ответа

Переносчиками сыпного тифа являются

блохи

платяные и лобковые вши

комары

клопы

114. Выберите правильный вариант ответа

Переносчиками малярии являются

москиты

комары

мокрецы

клещи

115. Выберите правильный вариант ответа

Источник инфекции при геморрагической лихорадке с почечным синдромом

полевые мыши

сельскохозяйственные животные

больной человек

дикие животные

116. Выберите правильный вариант ответа

Потенциальная проблема пациента при клещевом энцефалите

развитие параличей

повторное возникновение болезни

заражение родственников

формирование хронического вирусоносительства

117. Выберите правильный вариант ответа

Донор обязательно должен обследоваться на

дизентерию

сибирскую язву

вирусный гепатит "В"

малярию

118. Выберите правильный вариант ответа

Переносчики чумы

блохи

вши

клещи

слепни

119. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель сибирской язвы

вирус

бацилла

спирохета

сибирский сосальщик

120. Выберите правильный вариант ответа

Для профилактики бешенства применяют

антирабическую вакцину

антибиотики

бактериофаг

интерферон

121. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель бешенства

вирус

клостридия

боррелия

вибрион

122. Выберите правильный вариант ответа

Столбняк передается через

поврежденную кожу

неповрежденную кожу

верхние дыхательные пути

через ротовую полость

123. Выберите правильный вариант ответа

Для плановой профилактики столбняка используют

- противостолбнячный анатоксин
- противостолбнячную сыворотку
- антибиотики
- гамма – глобулин

124. Выберите правильный вариант ответа

Источник инфекции при роже

- больной человек и бактерионоситель
- больные сельскохозяйственные животные
- грызуны
- дикие животные

125. Выберите правильный вариант ответа

Основной возбудитель, вызывающий рожу

- сальмонелла
- стрептококк
- менингококк
- стафилококк

126. Выберите правильный вариант ответа

ВИЧ относится к семейству

- рабдовирусов
- гепадновирусов
- ретровирусов
- аденовирусов

127. Выберите правильный вариант ответа

Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита

- SIDA
- HIV
- AIDS
- LAV

128. Выберите правильный вариант ответа

В группу риска по ВИЧ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ входят

- косметологи
- лица, выезжающие за рубеж
- беременные
- реципиенты крови

129. Выберите правильный вариант ответа

В организме ВИЧ-инфицированного вирус присутствует

- во всех стадиях
- во всех стадиях, кроме инкубационной
- во всех стадиях, кроме клинических проявлений
- во всех стадиях, кроме терминальной

130. Выберите правильный вариант ответа

При ВИЧ-инфекции поражается система

- костная
- мышечная
- иммунная
- сердечно - сосудистая

131. Выберите правильный вариант ответа

Основное направление борьбы с ВИЧ-инфекцией

- массовая вакцинация

профилактическое лечение

изоляция ВИЧ - инфицированных от общества

санитарно-просветительская работа среди населения

132. Выберите правильный вариант ответа

ВИЧ-инфицированный человек имеет право вступать в половые контакты

- без всяких ограничений
- не имеет
- да, но должен предупредить своего партнера о том, что инфицирован, получить от него согласие на контакт и использовать презерватив
- да, но использовать презерватив

133. Выберите правильный вариант ответа

Запретить грудное вскармливание новорожденных детей матерям, которые инфицированы ВИЧ

- следует
- не следует, если соски не имеют трещин
- не следует, если полость рта новорожденных без повреждений
- не следует, если не прорезались зубы

134. Выберите 2 варианта ответа

Заболевание ботулизм может быть связано с употреблением в пищу

- консервов домашнего приготовления
- рыбы холодного копчения
- молока
- невымытых овощей и фруктов

135. Выберите 2 варианта ответа

Возбудителями пищевых токсикоинфекций могут быть

- стрептококки
- кишечная палочка
- шигеллы
- холерный вибрион

136. Выберите 2 варианта ответа

Источники инфекции при сальмонеллезе

- почва
- больные люди и бактерионосители
- больные животные
- насекомые

137. Выберите 2 варианта ответа

Источниками инфекции при бруцеллезе могут быть

- человек
- крупный рогатый скот
- мелкий рогатый скот
- грызуны

138. Выберите 2 варианта ответа

Источник инфекции при псевдотуберкулезе

- почва звериных нор
- больной человек
- грызуны
- продукты питания

139. Выберите 2 варианта ответа

Пути заражения вирусным гепатитом В

- парентеральный
- гемотрансфузионный
- пищевой
- воздушно-капельный

140. Выберите 2 варианта ответа
Пути заражения вирусным гепатитом А

- водный
- пищевой
- воздушно-пылевой
- парентеральный

141. Выберите 2 варианта ответа
Пути передачи аденовирусной инфекции

- воздушно-капельный
- водный
- алиментарный
- гемотрансфузионный

142. Выберите правильный вариант ответа
Основная причина хронического гастрита

- отравление
- аутоиммунные нарушения
- нерациональное питание
- хеликобактер пилори

143. Выберите правильный вариант ответа
Приоритетная проблема пациента с хроническим гастритом

- горечь во рту
- понос
- опоясывающая боль
- боль в эпигастральной области

144. Выберите правильный вариант ответа
Хронический гиперацидный гастрит может перейти в

- В12 анемию
- холецистит
- цирроз печени
- язвенную болезнь

145. Выберите правильный вариант ответа
Осложнение хронического атрофического гастрита

- рак желудка
- холецистит
- цирроз печени
- язвенная болезнь

146. Выберите правильный вариант ответа
Ведущий фактор возникновения язвенной болезни

- переохлаждение
- хеликобактер пилори
- физическая перегрузка
- вирусная инфекция

147. Выберите правильный вариант ответа
Ранние боли в эпигастральной области возникают после еды в течение

- 30 минут
- 2 часов
- 3 часов
- 4 часов

148. Выберите правильный вариант ответа
Боль при язве желудка локализуется в области

- левой подреберной
 - левой подвздошной
 - правой подвздошной
 - эпигастральной
- 149.** Выберите правильный вариант ответа
Основной симптом язвенной болезни желудка

- опоясывающая сверху живота
 - изжога
 - боль в эпигастральной области
 - диарея
- 150.** Выберите правильный вариант ответа
Осложнение язвенной болезни желудка

- изжога
 - отрыжка кислым
 - запор
 - желудочное кровотечение
- 151.** Выберите правильный вариант ответа
Основной признак желудочного кровотечения

- артериальная гипертония
 - жидкий стул типа «рисового отвара»
 - рвота "кофейной гущей"
 - «кинжальная» боль в эпигастрии
- 152.** Выберите правильный вариант ответа
Независимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении

- промывание желудка
 - очистительная клизма
 - грелка на живот
 - пузырь со льдом на живот
- 153.** Выберите правильный вариант ответа
Пациенту с язвенной болезнью рекомендуется

- голодание
 - уменьшение калорийности рациона
 - ограничение жидкости
 - частое дробное питание
- 154.** Выберите правильный вариант ответа
Ранний симптом рака желудка

- отвращение к мясу
 - горечь во рту, метеоризм
 - изжога, отрыжка кислым
 - запор, метеоризм
- 155.** Выберите правильный вариант ответа
Наиболее информативный метод диагностики рака желудка

- желудочное зондирование
 - дуоденальное зондирование
 - ультразвуковое исследование
 - эндоскопическое исследование с прицельной биопсией
- 156.** Выберите правильный вариант ответа
Психологическая проблема пациента при раке желудка

- похудание

- боль в животе
- рвота
- страх перед диагнозом

157. Выберите правильный вариант ответа

Пациенту при диарее рекомендуется

- молоко
- ржаной хлеб
- овощи и фрукты
- рисовый слизистый суп

158. Выберите правильный вариант ответа

Пациенту при запоре рекомендуется

- ограничение жидкости
- ограничение поваренной соли
- продукты, богатые клетчаткой
- продукты с малым содержанием клетчатки

159. Выберите правильный вариант ответа

Пациентам из рациона питания с заболеваниями печени исключают

- жареные котлеты
- кефир
- фрукты
- пшеничный хлеб

160. Выберите правильный вариант ответа

Симптом цирроза печени

- асцит
- повышение АД
- жажда
- повышение аппетита

161. Выберите правильный вариант ответа

Фактор риска хронического гепатита и цирроза печени

- ожирение
- инфицирование вирусом гепатита В
- гиподинамия
- низкий уровень жизни

162. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, при котором отмечаются "сосудистые звездочки" на верхней части туловища, желтуха, асцит

- гастрит
- холецистит
- цирроз печени
- энтерит

163. Выберите правильный вариант ответа

Осложнение при циррозе печени

- гипертонический криз
- инсульт
- болевой шок
- пищеводное кровотечение

164. Выберите правильный вариант ответа

После проведения абдоминальной пункции состояние пациента может осложниться

- рвотой
- гипертоническим кризом
- кратковременной потерей сознания

- лихорадкой

165. Выберите правильный вариант ответа

После абдоминальной пункции живот больного оставляют стянутым полотенцем для профилактики

- гипертонического криза
- кровоизлияния в мозг
- обморока
- отека легких

166. Выберите правильный вариант ответа

Основной симптом гиперкинетического типа дисфункции желчевыводящих путей

- резкая боль в правом подреберье
- резкая боль в левом подреберье
- ноющая боль в правом подреберье
- ноющая боль в левом подреберье

167. Выберите правильный вариант ответа

Основной симптом гипокинетического типа дисфункции желчевыводящих путей

- резкая боль в правом подреберье
- резкая боль в левом подреберье
- ноющая боль в правом подреберье
- ноющая боль в левом подреберье

168. Выберите правильный вариант ответа

Обострение хронического холецистита провоцирует

- ОРВИ
- переохлаждение
- прием фруктов
- прием жирной пищи

169. Выберите правильный вариант ответа

Симптом хронического холецистита

- рвота «кофейной гущей»
- мелена
- боль в правом подреберье
- боль в эпигастрии

170. Выберите правильный вариант ответа

Клинические симптомы хронического холецистита

- асцит, «сосудистые звездочки»
- боль в правом подреберье, тошнота
- отрыжка тухлым, рвота
- рвота «кофейной гущей», мелена

171. Выберите правильный вариант ответа

Показание для дуоденального зондирования

- острый холецистит
- хронический холецистит
- острый гастрит
- печеночная колика

172. Выберите правильный вариант ответа

Основной симптом желчнокаменной болезни

- снижение аппетита
- асцит
- тошнота
- боль в правом подреберье

173. Выберите правильный вариант ответа

Острый гломерулонефрит возникает после ангины через

- 1-2 дня
- 3-4 дня
- 1-2 недели
- 1-2 месяца

174. Выберите правильный вариант ответа
Количество мочи, необходимое для общего анализа

- 3-5 мл
- 10-15 мл
- 150-200 мл
- 300-400 мл

175. Выберите правильный вариант ответа
Диета при хроническом гломерулонефрите с выраженной азотемией

- основной вариант стандартной
- вариант с пониженным количеством белка
- вариант с пониженной калорийностью
- вариант с повышенным количеством белка

176. Выберите правильный вариант ответа
Диета при остром гломерулонефрите предусматривает ограничение

- белка
- углеводов
- жиров
- витаминов

177. Выберите правильный вариант ответа
Количество мочи для пробы по Нечипоренко

- 50 мл
- 100-200 мл из суточного количества
- 500-1000 мл
- 15-20 мл

178. Выберите правильный вариант ответа
Для проведения пробы по Зимницкому медсестра готовит пациенту

- сухую банку
- стерильную банку
- сухую пробирку
- 8 маркированных банок

179. Выберите правильный вариант ответа
Превышение ночного диуреза над дневным

- анурия
- никтурия
- олигоурия
- полиурия

180. Выберите правильный вариант ответа
Рекомендуемое суточное потребление жидкости при остром пиелонефрите

- 1500 мл
- 2500 мл
- 500 мл
- 1000 мл

181. Выберите правильный вариант ответа
Ограничивают в диете при хронической почечной недостаточности

- белки
- витамины

- жиры
- углеводы

182. Выберите правильный вариант ответа
Медсестра рекомендует пациенту при ожирении диету - вариант

- с пониженным содержанием белка
- с пониженной калорийностью
- стандартной
- вариант с повышенным содержанием белка

183. Выберите правильный вариант ответа
Пациенту с ожирением для проведения разгрузочных дней рекомендуют

- мучные блюда
- ограничение приема жидкости
- картофель
- нежирные кисломолочные продукты

184. Выберите правильный вариант ответа
Один из факторов развития диффузного токсического зоба

- психическая травма
- нерациональное питание
- злоупотребление алкоголем
- курение

185. Выберите правильный вариант ответа
Развивается при недостаточном содержании йода в питании

- диффузный токсический зоб
- ожирение
- сахарный диабет
- эндемический зоб

186. Выберите правильный вариант ответа
Заболевание, при котором суточный диурез составляет 5 литров

- гипотиреоз
- диффузный токсический зоб
- сахарный диабет
- эндемический зоб

187. Выберите правильный вариант ответа
Нагрузочный тест с глюкозой проводят для выявления

- декомпенсированного сахарного диабета
- нарушения толерантности к углеводам
- сахарного диабета инсулиннезависимого
- сахарного диабета инсулинозависимого

188. Выберите правильный вариант ответа
Наиболее частая причина развития железодефицитной анемии

- дефицит витаминов
- хронические кровопотери
- избыточное употребление жиров
- избыточное употребление белков

189. Выберите правильный вариант ответа
Бытовые аллергены

- домашняя пыль
- пенициллин

- пыльца березы
- клубника

190. Выберите правильный вариант ответа

Продукт, оптимальный по усвоению железа

- крупа
- молоко
- мясо
- хлеб

191. Выберите правильный вариант ответа

Основная причина В12-дефицитной анемии

- атрофический гастрит
- кровохарканье
- обильные менструации
- геморроидальные кровотечения

192. Выберите правильный вариант ответа

Подготовка пациента к плановому общему анализу крови

- утром - исключение приема пищи
- утром - обильный завтрак
- утром и вечером - обильный прием пищи
- вечером - исключение приема пищи

193. Выберите 3 правильных варианта ответа

Вторичная профилактика ожирения

- сбалансированное низкожировое питание
- питание по требованию
- разгрузочные дни
- высокая физическая нагрузка 1-2 раза в неделю
- ежедневная дозированная физическая нагрузка

194. Выберите 3 правильных варианта ответа

Причины развития сахарного диабета I типа

- ожирение
- наследственность
- вирусные инфекции с повреждением островков Лангерганса
- аутоиммунные заболевания
- неправильный тип питания

195. Выберите правильный ответ

Клинические проявления (проблемы пациента) при ревмокардите включают

- экспираторную одышку
- гипотермию, зябкость
- головную боль в связи повышением АД
- сердцебиение, перебои в работе сердца

196. Выберите 2 варианта ответа

Клинические проявления (проблем пациентов) при ревматическом артрите включают

- боль, отёчность крупных суставов
- бесследное исчезновение проявлений артрита
- стойкую деформацию с нарушением функции суставов в исходе
- боль, отёчность мелких суставов кистей

197. Выберите 2 варианта ответа

Потенциальные проблемы пациента при ревматизме

- инфаркт миокарда
- бронхиальная астма

- порок сердца
- сердечная недостаточность

198. Выберите 2 варианта ответа

Наиболее частые побочные эффекты при приеме диклофенака натрия

- тромбозы, эмболии
- канцерогенез
- желудочные кровотечения
- диспепсические нарушения

199. Выберите правильный ответ

При недостаточности аортальных клапанов происходит

- затруднение изгнания крови в аорту в систолу
- затруднение движения крови из предсердия в левый желудочек в диастолу
- обратный заброс крови из аорты в левый желудочек в диастолу
- обратный заброс крови в левое предсердие в систолу

200. Выберите правильный ответ

К факторам риска развития атеросклероза относят

- повышение ЛП высокой плотности, работа с большими физическими нагрузками
- женский пол, склонность к кровоточивости
- возраст (пожилой), мужской пол
- похудание, гипертиреоз (повышение гормонов щитовидной железы)

201. Выберите 2 варианта ответа

Нестабильными атеросклеротические бляшки называют в связи с

- низким риском осложнений
- высоким риском осложнений
- большими размерами бляшки, сужающей просвет сосуда
- риском быстрого роста окклюзии сосуда

202. Выберите 2 правильных варианта ответа

Осложнения атеросклероза (потенциальные проблемы пациента) включают

- гипертрофию поражённого органа
- злокачественное перерождение бляшки
- локальный фиброз органа в области поражения
- снижение функции поражённого органа (органный недостаток)

203. Выберите правильный ответ

Атеросклеротическое поражение мозговых артерий приводит к

- инфаркту миокарда
- расслаивающей аневризме аорты
- сердечной недостаточности
- инсульту

204. Выберите правильный ответ

Особенности диеты при атеросклерозе

- легкоусвояемая, высококалорийная
- с ограничением питьевого режима

- обогащённая насыщенными жирами и «быстрыми» углеводами
- с большим количеством пищевых волокон, полиненасыщенных жиров

205. Выберите правильный ответ

Эссенциальная артериальная гипертония провоцируется

- «задержанными» отрицательными эмоциями
- работой со значительными физическими нагрузками
- молодым возрастом
- ограничением употребления поваренной соли

206. Выберите правильный ответ

Вторичная артериальная гипертония развивается на фоне

- надпочечниковой недостаточности
- гипертермии (высокой степени лихорадки)
- отсутствия первичных органических поражений
- хронического заболевания почек

207. Выберите правильный ответ

АД 135/85 мм рт. ст. у взрослого относится к

- оптимальному
- пониженному
- «нормальному повышенному»
- первой степени артериальной гипертонии

208. Выберите 2 варианта ответа

Факторы, провоцирующие риск осложнений артериальной гипертонии

- АД 135/85 мм рт. ст.
- гликемия (утром натощак) 5,2 ммоль/л
- гипертрофия левого желудочка
- креатинин крови 0,24 ммоль/л

209. Выберите 2 варианта ответа

К изменениям в органах-мишенях при артериальной гипертонии относят

- пневмофиброз
- системный атеросклероз
- хронический гастрит
- нефросклероз

210. Выберите правильный ответ

Диета при артериальной гипертонии требует

- ограничения питьевого режима
- легкоусвояемой и калорийной пищи
- включения в рацион молочных продуктов
- ограничения поваренной соли

211. Выберите правильный ответ

Режим физических нагрузок при гипертонической болезни (АД контролируется) подразумевает

- постельный режим
- дозированные физические нагрузки
- уменьшение физических нагрузок
- не имеет значения

212. Выберите правильный ответ

Обморок - это форма острой недостаточности

- коронарной

- левожелудочковой
- правожелудочковой
- сосудистой

213. Выберите правильный ответ

Медсестра при обмороке придаёт пациенту положение

- с приподнятым головным концом
- с приподнятым ножным концом
- на левом боку
- на правом боку

214. Выберите правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при обмороке

- использование нитроглицерина
- введение мезатона
- применение паров нашатырного спирта
- проведение оксигенотерапии через пеногасители

215. Выберите правильный ответ

Сердечная астма - это проявление острой недостаточности

- коронарной
- левожелудочковой
- правожелудочковой
- сосудистой

216. Выберите правильный ответ

Ведущий симптом отека легких

- кашель с "ржавой" мокротой
- сердцебиение
- удушье
- головная боль

217. Выберите правильный ответ

Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени являются признаками

- инфаркта миокарда
- недостаточности кровообращения
- стенокардии
- артериальной гипертонии второй стадии

218. Выберите правильный ответ

Отеки сердечного происхождения увеличиваются

- утром на лице
- утром на ногах
- вечером на лице
- вечером на ногах

219. Выберите правильный ответ

Медицинская сестра при наличии отёков рекомендует больному ограничить приём

- поваренной соли
- животных белков
- нерафинированных углеводов
- растительных жиров

220. Выберите правильный ответ

Клиническое проявление синдрома коронарной недостаточности

- экспираторная одышка
- загрудинная боль

- головная боль на фоне повышения АД
- фебрильная лихорадка

221. Выберите правильный ответ

Основной симптом стенокардии

- кратковременная потеря сознания
- давящая боль за грудиной
- головная боль
- тошнота

222. Выберите правильный ответ

Загрудинная боль, продолжительностью 5-10 минут является признаком

- инфаркта миокарда
- ревматического эндокардита
- ревматического миокардита
- приступа стенокардии

223. Выберите правильный ответ

Появление сжимающей загрудинной боли (приступ стенокардии) требует

- введения морфина
- введения анальгина
- применения нитроглицерина под язык
- приема димедрола внутрь

224. Выберите правильный ответ

Эффект действия нитроглицерина наступает через (мин.)

- 1-2
- 10-15
- 20-25
- 30-40

225. Выберите 2 варианта ответа

Побочное действие нитроглицерина

- снижение артериального давления
- лихорадка
- повышение артериального давления
- головная боль

226. Выберите правильный ответ

Длительность боли при типичном приступе стенокардии не превышает

- 12 минут
- 60 минут
- 120 минут
- 180 минут

227. Выберите правильный ответ.

Появление одышки, розовой пенистой мокроты при инфаркте миокарда - признак

- крупозной пневмонии
- желудочного кровотечения
- лёгочного кровотечения
- отёка лёгких

228. Выберите правильный ответ

Основной симптом (проблема пациента) при ангинозной форме инфаркта миокарда

- головная боль
- загрудинная боль
- отеки на ногах

- сердцебиение

229. Выберите правильный ответ

Экстрасистолия - это

- уменьшение частоты сердечных сокращений
- увеличение частоты сердечных сокращений
- нарушение проводимости
- преждевременное возбуждение и сокращение сердца

230. Выберите правильный ответ

Форма инфаркта миокарда, реже встречающаяся в пожилом и старческом возрасте

- ангинозная
- астматическая
- аритмическая
- безболевая

231. Выберите правильный ответ

Артериальная гипертония у лиц пожилого и старческого возраста протекает на фоне

- атеросклероза
- болезни Иценко-Кушинга
- хронического гломерулонефрита
- феохромоцитомы

232. Выберите 2 варианта ответа

Основная причина развития застойной сердечной недостаточности в пожилом возрасте - это:

- артериальная гипертония
- ишемическая болезнь сердца
- клапанные пороки сердца
- коллагеновые заболевания

233. Выберите правильный вариант ответа

Приоритетная проблема пациента после общей анестезии

- острая задержка мочи
- рвота
- недостаточность самогигиены
- ограничение физической активности

234. Выберите правильный вариант ответа

Первый этап сестринского процесса у пациента с внутренним кровотечением

- оценка пульса
- выявление проблемы
- составление плана сестринского ухода
- формулировка целей ухода

235. Выберите правильный вариант ответа

Состояние пациента в начале гемотрансфузионного шока

- адинамичный
- беспокойный
- неконтактный
- вялый

236. Выберите правильный вариант ответа

Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде

- дефицит самоухода
- беспокойство за оставленную работу

чувство страха

недооценка тяжести своего состояния

237. Выберите правильный вариант ответа

Защитное мышечное напряжение характерно для

острого перитонита

отечной формы панкреатита

инвагинации кишечника

желудочного кровотечения

238. Выберите правильный вариант ответа

Психологическая проблема пациента с травмой

боли в месте повреждения

страх операции

недостаточная самогигиена

нарушение целостности кожного покрова

239. Выберите правильный вариант ответа

Приоритетная проблема пациента с обширным ранением мягких тканей

расстройство схемы тела

чувство беспомощности

острая боль

лихорадка

240. Выберите правильный вариант ответа

Приоритетная проблема пациента с ранением на этапе неотложной помощи

кровотечение

дефицит движения

ограничение самоухода

угроза инфицирования

241. Выберите два правильных варианта ответа

Рекомендации при варикозной болезни

ношение теплых носков

возвышенное положение ног во время сна

холодные ванночки для стоп

ношение компрессионного трикотажа

занятия силовыми видами спорта

242. Выберите два правильных варианта ответа

Возможные осложнения варикозного расширения вен нижних конечностей

кровотечения

трофические язвы

перемежающаяся хромота

сухая гангрена

отек тканей

243. Выберите правильный вариант ответа

Какая степень гипотрофии у ребёнка лечится в домашних условиях

2 степень

3 степень

1 степень

4 степень

244. Выберите правильный вариант ответа

Краснуха, возникшая в 1 триместр беременности, опасна развитием

бронхиальной астмы у женщины

пиелонефрита у женщины

сахарного диабета у женщины

врожденных пороков у ребенка

245. Выберите правильный вариант ответа

Строгое соблюдение постельного режима показано ребенку с пиелонефритом

в первый день болезни

в острый период заболевания

до полного клинического выздоровления

246. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте

0,5-1

1-3

3-6

7-15

247. Выберите правильный вариант ответа

Ведущее значение при лечении гипотрофии имеет

дезинтоксикация

оксигенотерапия

диетотерапия

антибиотикотерапия

248. Выберите правильный вариант ответа

Уменьшение суточного объема мочи у ребенка – это

олигурия

анурия

полиурия

поллакиурия

249. Выберите правильный вариант ответа

Время, отведенное для первого этапа реанимации при асфиксии новорожденного

20-25 сек

20-25 мин

5-10 сек

5-10 мин

250. Выберите 2 варианта ответа

Основными причинами развития паратрофии являются

недостаточность питания

диспептические расстройства

гиподинамия

перекорм

251. Выберите 2 варианта ответа

Специфическую профилактику кори проводят вакциной в возрасте

1 года

3-х лет

6 лет

11 лет

252. Выберите 2 варианта ответа

Иммунопрофилактика проводится детям в Российской Федерации

ветряной оспы

скарлатины

эпидемического паротита

кори

253. Выберите правильный вариант ответа

Острота зрения в норме

- 0,1
- 0,07
- 1,0
- 0,3

254. Выберите правильный вариант ответа

Уровень внутриглазного давления в норме

- 15-20 мм рт. ст
- 24-32 мм рт. ст
- 18-24 мм рт. ст
- 26 и выше

255. Выберите 2 варианта ответа

Правильные действия медработника в ответ на грубость пациентки с психическими расстройствами

- сообщить врачу
- немедленно перевести в надзорную палату
- попытаться отвлечь внимание больного
- использовать методы механического стеснения

больного

256. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее часто инвалидность развивается вследствие заболеваний

- сердечнососудистой системы
- опорно-двигательного аппарата
- органов дыхания
- органов пищеварения

257. Выберите правильный вариант ответа

Занятия на тренажёрах оказывают эффект

- общеукрепляющий
- противовоспалительный
- гипотензивный
- анальгезирующий

258. Выберите правильный вариант ответа

Противопоказанием к назначению ЛФК при заболеваниях ЖКТ является

- острый болевой синдром
- анацидный гастрит
- атонический колит
- спастический колит

259. Выберите правильный вариант ответа

Терренкур, это

- лечение дозированным восхождением
- ходьба по трафарету
- ходьба перед зеркалом
- прогулки по ровной местности

260. Выберите правильный вариант ответа

Под воздействием ультрафиолетовых лучей в организме образуется витамин

- D
- B
- C

A

261. Выберите правильный вариант ответа

Гидротерапия это лечение

- пресной водой
- минеральной водой
- грязью
- глиной

262. Выберите правильный вариант ответа

Пелоидотерапия это лечение

- грязью
- глиной
- парафином
- озокеритом

263. Выберите правильный вариант ответа

Реабилитация это

- восстановление самостоятельности пациента
- профилактика обострений
- лечение осложнений
- разработка стандартов

264. Выберите правильный вариант ответа

Первичной физио-профилактикой является предупреждение

- заболеваний
- рецидивов
- обострения заболевания
- осложнений

265. Выберите правильный вариант ответа

Терапевтический эффект парафина

- рассасывающий
- бактерицидный
- гипосенсибилизирующий
- анацидный

266. Выберите правильный вариант ответа

Теплоносители, применяемые в лечебных учреждениях

- озокерит
- песок
- соль
- сода

267. Выберите правильный вариант ответа

Осуществляется с помощью электрофореза

- введение лекарственного вещества в организм
- электросон
- электромассаж мышц
- микромассаж тканей

268. Выберите 2 варианта ответа

Методы теплолечения

- парафинотерапия
- озокериттерапия
- талассотерапия
- лазеротерапия

02.01. ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса

269. Выберите правильный вариант ответа

Отеки почечного происхождения появляются

- утром на ногах
- утром на лице
- вечером на ногах
- вечером на лице

270. Выберите правильный вариант ответа

Ранним проявлением развивающихся скрытых отеков является

- гидроторакс
- гидроперикард
- увеличение живота
- увеличение массы тела

271. Выберите правильный вариант ответа

Моча цвета "мясных помоев" обусловлена содержанием большого количества

- бактерий
- лейкоцитов
- цилиндров
- эритроцитов

272. Выберите правильный вариант ответа

Медсестра для сбора мочи на общий анализ должна обеспечить пациента

- сухой банкой
- сухой пробиркой
- стерильной банкой
- стерильной пробиркой

273. Выберите правильный вариант ответа

Суточный диурез у пациента с острым гломерулонефритом составил 400 мл - это

- анурия
- олигоурия
- полиурия
- протеинурия

274. Выберите правильный вариант ответа

Анурия - это

- много мочи
- нормальное количество мочи
- преобладание ночного диуреза над дневным
- отсутствие мочи

275. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, сопровождающееся пиурией

- гломерулонефрит
- почечнокаменная болезнь
- пиелонефрит
- нефропатия

276. Выберите правильный вариант ответа

Проба по Нечипоренко проводится при

- пиелонефрите
- плеврите
- пневмонии
- перитоните

277. Выберите правильный вариант ответа

Превышение ночного диуреза над дневным

- анурия
- никтурия
- олигоурия
- полиурия

278. Выберите правильный вариант ответа

Суточный диурез 3500 мл - это

- анурия
- олигоурия
- полиурия
- никтурия

279. Выберите правильный вариант ответа

Осложнение острого гломерулонефрита

- лихорадка
- головная боль
- отеки
- острая почечная недостаточность

280. Выберите правильный вариант ответа

Основная причина острого пиелонефрита

- инфекция мочевых путей
- В-гемолитический стрептококк
- артериальная гипертония
- гипокинезия

281. Выберите правильный вариант ответа

Характерное изменение в анализе мочи при остром пиелонефрите

- гематурия
- лейкоцитурия
- цилиндрурия
- глюкозурия

282. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, основным проявлением которого является почечная колика

- хронический гломерулонефрит
- острый пиелонефрит
- мочекаменная болезнь
- острый гломерулонефрит

283. Выберите правильный вариант ответа

Приоритетная проблема пациента при почечной колике

- тошнота
- боль в пояснице
- лихорадка
- одышка

284. Выберите правильный вариант ответа

Появляется в моче при почечной колике

- гематурия
- бактериурия
- глюкозурия
- лейкоцитурия