

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

**для самостоятельной работы лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и
претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации
по специальности «Акушерское дело»
для подготовки к тестовому контролю знаний –
1 этапа специального экзамена**

г. Новосибирск

2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации при проведении 1 этапа специального экзамена – тестирование.

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» представлены типовые тестовые задания первого уровня (на выбор одного или нескольких правильных ответов) по всем профессиональным модулям с учетом профессиональных компетенций, которые введены в компьютерную программу тестирования. Тестовые задания представлены только в закрытой форме. При выполнении задания от вас требуется проанализировать верный ответ. Ответ на задание превращается в законченное утверждение. Ваши ответы на тестовые задания вы можете сверить с правильными ответами предложенных эталонов, которые содержатся в конце каждого модуля.

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования Федерального государственного образовательного стандарта по специальности.

Для специалистов сформированы свыше 1000 тестовых заданий

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 100 тестов. На работу с тестом отводится 100 мин.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение аттестуемым тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц

1. Выберите правильный вариант ответа

Влагалищное исследование у здоровой беременной в ЖК производится

- при каждой явке в ЖК
- 1 раз за триместр
- однократно при постановке на учет
- раз в месяц для оценки динамики изменений

2. Выберите правильный вариант ответа

Осмотр в зеркалах и взятие мазков на исследование влагалищной флоры у здоровой беременной проводят в ЖК

- однократно при постановке на учет
- при каждой явке в ЖК
- трижды за беременность
- только при наличии жалоб

3. Выберите правильный вариант ответа

Анализ мочи для обследования беременной в ЖК назначается

- трижды за беременность
- только при наличии дизурических явлений
- раз в 1-2 месяца
- к каждой явке

4. Выберите правильный вариант ответа

Трижды за беременность каждая здоровая женщина сдает

- кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоцитоз
- кровь на группу и резус-фактор
- мазки на скрытые инфекции
- мазки на гормональную угрозу

5. Выберите правильный вариант ответа

Беременная во втором триместре беременности посещает ЖК

- 1 раз в месяц
- 1 раз в 2 недели
- каждую неделю
- 2 раза в неделю

6. Выберите правильный вариант ответа

Осмотр окулиста во время беременности

- обязателен только для только женщин с конъюнктивитом
- обязателен только для женщин после оперативной коррекции зрения

не обязателен

необходим всем для оценки зрения и состояния сосудов глазного дна

7. Выберите правильный вариант ответа

Флюорография легких у беременных

- назначается однократно при постановке на учет
- проводится в 1 и 2 половине беременности
- не показана при желанной беременности
- назначается трижды за беременность

8. Выберите правильный вариант ответа

Рекомендуется проведение ультразвукового исследования во время беременности

- только женщинам из группы риска
- один раз при постановке на учет
- каждый месяц
- 3 раза за беременность

9. Выберите правильный вариант ответа

Ультразвуковое исследование

- абсолютно противопоказано в ранние сроки беременности
- обязательно для поступления в родильный дом
- не рекомендуется женщинам из группы генетического риска
- проводится только по желанию женщины

10. Выберите правильный вариант ответа

Кровь на альфафетопротеины назначают с целью выявления

- рвоты беременных
- преэклампсии
- пороков развития плода
- невынашивания

11. Выберите 2 правильных варианта ответа

Ранние методы пренатальной диагностики

- определение ХГЧ и плацентарного протеина
- амниоцентез
- УЗИ
- кордоцентез
- определение плацентарного лактогена

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов, послеродового периода

12. Выберите правильный вариант ответа

Всем беременным рекомендуется принимать профилактически

- комплексы витаминов для беременных
- седативные средства
- антибиотики
- сохраняющие средства

13. Выберите правильный вариант ответа
Витамины во время беременности

- можно принимать без консультации врача
- не могут причинить вред плоду в период эмбриогенеза

как любые лекарственные средства, должны назначаться акушером

не следует назначать из-за опасности возникновения фетопатии

14. Выберите правильный вариант ответа
Прикладывание ребенка к груди матери при отсутствии осложнений рационально

- в родильном зале
- после перевода в послеродовое отделение
- через 6 часов после родов
- на вторые сутки после родов

15. Выберите правильный вариант ответа
Женщине рекомендуется планировать рождение первого ребенка

- раньше 18 лет
- в пубертатном возрасте
- в раннем репродуктивном возрасте
- в позднем репродуктивном возрасте

16. Выберите правильный вариант ответа
Метод психопрофилактической подготовки к родам

- проводится только для женщин из группы высокого риска
- позволяет полностью избежать болевых ощущений в родах

ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, родах и послеродовом периоде

21. Выберите правильный вариант ответа
Обработку рук перед родами следует проводить кожным антисептиком

- перманганатом калия
- фурацилином
- хлоргексидина глюконатом
- анолитом

22. Выберите правильный вариант ответа
Большие половые губы покрыты

- кожей
- слизистой оболочкой
- цилиндрическим эпителием
- кубическим эпителием

рекомендуется всем беременным для уменьшения болевых ощущений в родах

показал свою полную неэффективность

17. Выберите правильный вариант ответа
Наиболее рациональным в последние годы признано

- раздельное пребывание после родов матери и плода
- совместное пребывание матери и плода в многоместной палате.

совместное пребывание матери и плода в отдельной палате со всеми удобствами

выписка родильницы домой на 2 сутки после родов

18. Выберите правильный вариант ответа
Наиболее рациональным является в первый месяц кормление ребенка

- по его требованию
- кормление по часам через 3-4 часа
- кормление по часам через 3-часа с ночным 6-часовым интервалом
- кормление по часам с ночным 9-часовым интервалом

19. Выберите правильный вариант ответа
Женщине после родов не рекомендуется жить половой жизнью

- 10 дней
- 2 недели
- 3 недели
- 1,5-2 месяца

20. Выберите правильный вариант ответа
Повышению лактации способствуют

- мочегонные средства
- солевые слабительные средства
- укроп и фенхель
- камфара

23. Выберите правильный вариант ответа
Длина уретры составляет

- 3-4см
- 6-7см
- 8-9см
- 10-12см

24. Выберите правильный вариант ответа
Реакция влагалищной среды в норме

- кислая
- нейтральная
- слабощелочная
- резкощелочная

25. Выберите правильный вариант ответа

Влагалище называется

- Vulva
- Salpinx
- Colpos
- Uterus

26. Выберите правильный вариант ответа
Наружный зев не рожавшей женщины имеет форму

- точечную
- щелевидную
- т-образную
- серповидную

27. Выберите правильный вариант ответа
Следующая фаза за фазой регенерации в слизистой матки

- десквамации
- пролиферации
- секреции
- дегенерации

28. Выберите правильный вариант ответа
Происходит во время месячных отторжение

- всего мукозного слоя
- всего эндометрия
- функционального слоя эндометрия
- базального слоя эндометрия

29. Выберите правильный вариант ответа
Оплодотворение в норме происходит в

- матке
- яичнике
- ампулярной части трубы
- шейке матки

30. Выберите правильный вариант ответа
Погружение зародыша в слизистую матки называется

- овуляция
- оплодотворение
- имплантация
- плацентация

31. Выберите правильный вариант ответа
Объем циркулирующей крови во время беременности

- понижается
- повышается
- не изменяется
- увеличивается только в 1 триместре

32. Выберите правильный вариант ответа
Эпителий, выстилающий влагалище, называется

- кубический
- цилиндрический
- призматический мерцательный
- многослойный плоский

33. Выберите правильный вариант ответа
Реакция влагалищной среды в норме

- кислая
- нейтральная
- слабощелочная
- резкощелочная

34. Выберите правильный вариант ответа
Форма шейки матки нерожавшей женщины

- цилиндрическая
- призматическая
- коническая
- шарообразная

35. Выберите правильный вариант ответа
Фаза регенерации предшествует фазе

- десквамации
- пролиферации
- секреции
- дегенерации

36. Выберите правильный вариант ответа
Реакция среды полости матки

- щелочная
- кислая
- нейтральная
- pH 5,5

37. Выберите правильный вариант ответа
Продолжительность нормальных месячных

- 3-7 дней
- 7-8 дней
- 6-10 дней
- 1-2 дня

38. Выберите правильный вариант ответа
Овуляцией называется

- погружение яйцеклетки в эндометрий
- слияние гамет
- выход яйцеклетки из граафова пузырька
- дробление зиготы

39. Выберите правильный вариант ответа
Желтым телом вырабатывается

- пролактин
- прогестерон
- окситоцин
- тиреоидин

40. Выберите правильный вариант ответа
Прогестерон вырабатывается в

- гипоталамусе
- гипофизе
- яичнике
- матке

41. Выберите правильный вариант ответа
Самая широкая часть маточной трубы называется

- истмическая
- интерстициальная

- интрамуральная
- ампулярная

42. Выберите правильный вариант ответа

Наружные размеры нормального таза

- 23-25-28-18
- 25-28-31-18
- 25-28-31-21
- 28-28-32-17

43. Выберите правильный вариант ответа

Истинная конъюгата нормального таза

равна

- 9 см
- 11 см
- 13 см
- 21 см

44. Выберите правильный вариант ответа

Диагональная конъюгата нормального таза

равна

- 9 см
- 11 см
- 12,5-13 см
- 21 см

45. Выберите правильный вариант ответа

Расстояние между нижним краем симфиза

и наиболее выдающейся точкой мыса

называется конъюгатой

- истинной
- диагональной
- наружной
- анатомической

46. Выберите правильный вариант ответа

Расстояние между верхним краем симфиза

и верхним углом ромба Михаэлиса

называется конъюгатой

- боковой
- диагональной
- наружной
- истинной

47. Выберите правильный вариант ответа

Наружная конъюгата измеряется в

положении лежа

- на спине с вытянутыми ногами
- на спине с согнутыми ногами
- на боку с согнутой вышележащей ногой.
- на боку с согнутой нижележащей ногой

48. Выберите правильный вариант ответа

Оплодотворение в норме происходит в

- матке
- яичнике
- трубе
- брюшной полости

49. Выберите правильный вариант ответа

Погружение зародыша в слизистую матки называется

- овуляция
- оплодотворение
- имплантация
- плацентация

50. Выберите правильный вариант ответа

Нормальным к концу беременности

является объем околоплодных вод

- 100-300 мл
- 1000 мл
- 1,5-2 л
- 2-3 л

51. Выберите правильный вариант ответа

Прогестерон во время беременности,

помимо яичников, вырабатывается также

- гипофизом
- плацентой
- гипоталамусом
- щитовидной железой

52. Выберите правильный вариант ответа

Прямой размер головки доношенного плода

равен

- 9,5 см
- 10 см
- 12 см
- 14 см

53. Выберите правильный вариант ответа

Малый косой размер головки доношенного

плода равен

- 9,5 см
- 11 см
- 12 см
- 13,5 см

54. Выберите правильный вариант ответа

Тошнота является признаком беременности

- достоверным
- вероятным
- сомнительным
- обязательным

55. Выберите правильный вариант ответа

Вероятным признаком беременности

является

- слюнотечение
- задержка месячных
- рвота
- вкусовые причуды

56. Выберите правильный вариант ответа

Достоверным признаком беременности

является

- увеличение матки
- задержка месячных
- увеличение молочных желез

- выслушивание сердцебиения плода
- 57.** Выберите правильный вариант ответа
Диагностическая проба на беременность (ан. мочи) основана на выявлении
- ацетона
 белка
 хорионического гонадотропина
 лейкоцитов
- 58.** Выберите правильный вариант ответа
Масса матки при доношенной беременности достигает
- 3 кг
 1 кг
 500 г
 300 г
- 59.** Выберите правильный вариант ответа
Объем циркулирующей крови во время беременности
- понижается
 повышается
 не изменяется
 увеличивается только в 1 триместре
- 60.** Выберите правильный вариант ответа
Оптимальной является прибавка массы беременной за 1 неделю на
- 30 г
 50 г
 300 г
 700 г
- 61.** Выберите правильный вариант ответа
Свертывающие свойства крови к концу нормальной беременности
- повышены
 понижены
 не изменены
 можно не учитывать для прогноза родов
- 62.** Выберите правильный вариант ответа
Типичные жалобы у беременной в 1 триместре
- головные боли и ухудшение зрения
 тошнота и изменение вкуса
 шевеление плода
 отеки
- 63.** Выберите правильный вариант ответа
Продолжительность нормальной беременности
- 250 дней
 280 дней
 350 дней
 380 дней
- 64.** Выберите правильный вариант ответа

- Повторнородящие женщины начинают ощущать шевеление плода чаще всего начиная с
- 8 недель
 12 недель
 18 недель
 22 недель
- 65.** Выберите правильный вариант ответа
Срок беременности, начиная с которого сердцебиение плода можно выслушать акушерским стетоскопом
- 12 недель
 18 недель
 22 недели
 28 недель
- 66.** Выберите правильный вариант ответа
Срок беременности, начиная с которого можно пропальпировать головку плода через брюшную стенку
- 12 недель
 18 недель
 24 недели
 30 недель
- 67.** Выберите правильный вариант ответа
Определение массы плода по методу Жордания
- перемножить полуокружность живота и длину плода
 умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
 разделить окружность живота на высоту стояния дна матки
 от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки
- 68.** Выберите правильный вариант ответа
Срок беременности, при котором дно матки находится на середине между пупком и лобком
- 12 недель
 14 недель
 16 недель
 20 недель
- 69.** Выберите правильный вариант ответа
Срок беременности, при котором дно матки находится на середине между пупком и мечевидным отростком
- 20 недель
 24 недели
 32 недели
 38 недель
- 70.** Выберите правильный вариант ответа
Нормальным можно считать сердцебиение плода

- 165 уд/мин
- 135 уд/мин
- 115 уд/мин
- 95 уд/мин

71. Выберите правильный вариант ответа
Отношение спинки плода кпереди или кзади называется

- предлежанием
- положением
- позицией
- видом

72. Выберите правильный вариант ответа
Отношение оси плода к оси матки называется

- положением
- предлежанием
- позицией
- видом

73. Выберите правильный вариант ответа
Третий прием Леопольда-Левицкого позволяет выявить

- положение плода
- предлежание и вид плода
- позицию плода
- вид позиции

74. Выберите правильный вариант ответа
Положение, позиция и вид плода определяется приемом Леопольда-Левицкого номер

- 1
- 2
- 3
- 4

75. Выберите правильный вариант ответа
Признаком зрелости шейки накануне родов является

- длина шейки 3 см
- отклонение шейки кзади
- проходимость наружного зева для кончика пальца
- укорочение шейки до 1 см

76. Выберите 2 правильных варианта ответа

- Вторым приёмом Леопольда определяют
- предлежащую часть
 - отношение предлежащей части ко входу в малый таз
 - положение
 - позицию и вид плода
 - членорасположение

77. Выберите 2 правильных варианта ответа

Локализацию головки по наружным данным можно определить

- 3-им приёмом Леопольда
- 4-м приёмом Леопольда
- способом Роговина
- методом Пискачека
- методом Абуладзе

78. Выберите 2 правильных варианта ответа

Плоскость выхода малого таза ограничена

- нижним краем симфиза
- серединой симфиза
- седалищными буграми
- седалищными остями
- мысом крестца

79. Выберите 2 правильных варианта ответа

Границами истинной конъюгаты являются

- наиболее выступающий край мыса
- крестцово-копчиковое сочленение
- выступающий верхне-внутренний край симфиза
- середина симфиза
- копчик

80. Выберите 2 правильных варианта ответа

Истинную конъюгату можно вычислить по

- диагональной конъюгате
- косой конъюгате
- наружной конъюгате
- боковой конъюгате
- высоте лона

81. Выберите 2 правильных варианта ответа

Истинная конъюгата вычисляется по диагональной с учётом

- прямого размера выхода из малого таза
- высоты большого таза
- высоты лона
- окружности таза
- индекса Соловьёва

82. Выберите 2 правильных варианта ответа

Сомнительными признаками беременности являются

- повышение артериального давления
- извращение вкуса и обоняния
- частые мочеиспускания
- потливость
- тошнота и рвота

83. Выберите 2 правильных варианта ответа

Достоверными признаками беременности являются

- пигментация сосков и ареол
- цианоз слизистой влагалища
- пальпация частей плода
- положительный тест на ХГЧ
- размягчение в области перешейка

84. Выберите 2 правильных варианта ответа

Диагностические методы, основанные на применении ультразвуковых колебаний

- КТГ
- ЭКГ
- доплерометрия
- амниоскопия
- гистероскопия

85. Выберите 2 правильных варианта ответа

Зрелая шейка матки

- мягкая
- длиной 3-4см
- расположена по оси родового канала
- наружный зев закрыт
- сакрализована

86. Выберите 2 правильных варианта ответа

Необходимо для своевременного развития родовой деятельности

- наличие сформировавшейся родовой доминанты
- отсутствие экстрагенитальной патологии
- наличие зрелой шейки матки
- ограничение подвижности плода в матке

87. Выберите 2 правильных варианта ответа

Наружными половыми органами являются

- влагалище
- маточные трубы
- лобок
- молочные железы
- малые половые губы

88. Выберите 2 правильных варианта ответа

Внутренними половыми органами являются

- лобок
- мочевого пузыря
- влагалище
- тазовая клетчатка
- маточные трубы

89. Выберите 2 правильных варианта ответа

Внутренними половыми органами являются

- лобок
- мочевого пузыря
- матка
- тазовая клетчатка
- яичники

90. Выберите 2 правильных варианта ответа

Яичники продуцируют

- ферменты
- сперматозоиды
- яйцеклетки
- женские половые гормоны
- форменные элементы крови

91. Выберите 2 правильных варианта ответа

Состав тазовой кости

- крестец
- крестцовый мыс
- копчик
- лонная кость
- седалищная кость

92. Выберите 2 правильных варианта ответа

Овуляцией называют

- разрыв фолликула
- выход яйцеклетки из фолликула
- слияние сперматозоида с яйцеклеткой
- прикрепление яйцеклетки к стенке матки
- отторжение функционального слоя

93. Выберите 2 правильных варианта ответа

Гормон желтого тела прогестерон способствует

- росту молочных желез
- прерыванию беременности
- развитию яйцеклетки
- созреванию фолликула
- сохранению беременности

94. Выберите 2 правильных варианта ответа

Сомнительными признаками беременности являются

- повышение артериального давления
- извращение вкуса и обоняния
- частые мочеиспускания
- потливость
- тошнота и рвота

95. Выберите 2 правильных варианта ответа

Вероятные признаки беременности

- тошнота

- изменение артериального давления
 - синюшность слизистой влагалища и шейки матки
 - сонливость
 - отсутствие менструации
- 96.** Выберите 2 правильных варианта ответа
Вероятные признаки беременности
- тошнота
 - изменение артериального давления
 - изменение величины матки
 - сонливость
 - изменение формы и консистенции матки
- 97.** Выберите 2 правильных варианта ответа
Прибавка массы тела за неделю во время беременности составляет
- 300 г
 - 400 г
 - 500 г
 - 600 г
 - 1000 г
- 98.** Выберите правильный вариант ответа
Головка при заднем виде затылочного прорезывается
- малым косым размером
 - большим косым размером
 - средним косым размером
 - прямым размером
- 99.** Выберите правильный вариант ответа
Точка, вокруг которой происходит разгибание головки при биомеханизме родов, называется
- проводной
 - ведущей
 - точкой фиксации
 - точкой отсчета
- 100.** Выберите правильный вариант ответа
Схватки в активной фазе первого периода родов
- через 4-5 минут по 35 секунд
 - через 12-15 минут по 10 секунд
 - через 1-2 минуты по 60 секунд
 - через 8-10 минут по 25 секунд
- 101.** Выберите правильный вариант ответа
Схватки в период изгнания
- через 1 минуту по 60 секунд
 - через 3 минуты по 50 секунд
 - через 5-6 минут по 25 секунд
 - через 7-8 минут по 25 секунд
- 102.** Выберите правильный вариант ответа
Второй период родов начинается с момента
- полного раскрытия шейки

- начала потужных схваток
 - отхождения вод
 - появления схваток через 3 минуты по 40 секунд
- 103.** Выберите правильный вариант ответа
Своевременным для первых родов считается отхождение вод при раскрытии
- 1-2 см
 - 3-4 см
 - 5-6 см
 - 6-7 см
- 104.** Выберите правильный вариант ответа
Роженице в фильтре проводится
- осмотр на зеркалах
 - термометрия
 - очистительная клизма
 - исследование мочи на белок
- 105.** Выберите правильный вариант ответа
Удлинение наружного отрезка пуповины на 10 см называется признаком отделения последа
- Альфельда
 - Шредера
 - Кюстнера-Чукалова
 - Клейна
- 106.** Выберите правильный вариант ответа
После рождения ребенка следует
- предложить роженице потужиться
 - положить лед и груз на матку
 - выпустить мочу катетером
 - применить наружные приемы отделения последа
- 107.** Выберите правильный вариант ответа
Появление положительных признаков отделения плаценты и физиологической кровопотере требует
- ввести сокращающие средства
 - предложить женщине потужиться
 - потянуть за пуповину
 - надавить на матку в области углов
- 108.** Выберите правильный вариант ответа
Нормальная продолжительность родов у первородящей женщины
- 3-4 часа
 - 5-6-часов
 - 7-9 часов
 - 12-16 часов
- 109.** Выберите правильный вариант ответа
Верхняя границы физиологической кровопотери в родах
- 0,5% от массы тела
 - 0,6% от массы тела
 - 1% от массы тела

5% от массы тела

110. Выберите правильный вариант ответа
Продолжительность раннего послеродового периода

- 2 часа
- 12 часов
- 1 сутки
- 5-6 дней

111. Выберите правильный вариант ответа
Родильница остается для наблюдения после нормальных родов в родильном отделении

- 1 час
- 2 часа
- 6 часов
- сутки

112. Выберите правильный вариант ответа
Осмотр родовых путей после родов проводится

- всем женщинам
- только первородящим
- только повторнородящим
- только женщинам из группы риска

113. Выберите правильный вариант ответа
Совокупность движений, совершаемых плодом при прохождении через таз и родовые пути, называют

- асинклитизмом
- конфигурацией головки
- биомеханизмом родов
- контракцией

114. Выберите правильный вариант ответа
Влагалищное исследование в родах производится

- каждые 2 часа
- каждые 6 часов
- при отхождении околоплодных вод
- после рождения последа для осмотра шейки

115. Выберите правильный вариант ответа
Сердцебиение во втором периоде родов выслушивают

- на протяжении всего периода, включая схватки
- в промежутках между каждой схваткой
- через 15 минут
- через 30 минут

116. Выберите правильный вариант ответа
Дно матки на 3 сутки после родов

- на уровне пупка
- на 1 поперечный палец ниже пупка
- на 3 поперечных пальца ниже пупка
- на 1 поперечный палец выше лобка

117. Выберите правильный вариант ответа

Ярко-кровянистые лохии после родов в норме бывают

- 2-3 дня
- 10 дней
- 2 недели
- до конца декретного отпуска

118. Выберите правильный вариант ответа
Умеренное нагрубание молочных желез у родильницы начинается чаще

- в родах
- в первые сутки послеродового периода
- во вторые сутки послеродового периода
- на третьи сутки послеродового периода

119. Выберите правильный вариант ответа
Шейка полностью сформирована после родов

- на 3 день
- через неделю
- через 2 недели
- через 3 недели

120. Выберите 2 правильных варианта ответа

Прелиминарный период характеризуется

- формированием родовой доминанты
- появлением регулярной родовой деятельности
- формированием зрелой шейки матки
- формированием нижнего сегмента

121. Выберите 2 правильных варианта ответа

Родовые схватки характеризуются

- произвольностью, периодичностью и длительностью
- силой сокращения и болезненностью
- произвольностью
- сокращением матки в области нижнего сегмента

122. Выберите 2 правильных варианта ответа

Раскрытие зева и сглаживание шейки матки происходит под влиянием

- контракции
- плодного пузыря
- контракции и ретракции
- дистракции

123. Выберите 2 правильных варианта ответа

Начало 1-го периода родов проявляется

- регулярными схватками 1-2 схватки за 10 минут
- сглаживанием и раскрытием шейки матки
- формированием плодного пузыря

излитием вод

124. Выберите 2 правильных варианта ответа

Регулярная родовая деятельность характеризуется

наличием схваток нарастающих по силе и частоте

появлением сукровичных выделений

сглаживанием и раскрытием шейки матки

разрывом плодного пузыря

125. Выберите 2 правильных варианта ответа

Предвестниками родов являются

регулярные, частые схватки

отхождение околоплодных вод

ложные схватки

головная боль

опущение дна матки

126. Выберите 2 правильных варианта ответа

Своевременное отхождение околоплодных вод происходит

при полном открытии маточного зева

при опущении головки в полость малого таза

при почти полном открытии маточного зева

при появлении потуг

в начале раскрытия шейки матки

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах

127. Выберите правильный вариант ответа

Роженице не рекомендуется тужиться

при прорезывании теменных бугров

при наружном повороте головки

после рождения головки

при положительных признаках

отделения последа

128. Выберите правильный вариант ответа

Метод Пискачека в родах указывает на

клиническое несоответствие таза и головки

угрозу разрыва матки

уровень расположения головки в малом тазу

отделение последа

129. Выберите 2 правильных варианта ответа

Вариант биомеханизма родов определяется

расположением родничков

расположением стреловидного шва

степенью конфигурации головки

образованием кефалогематомы

130. Выберите 2 правильных варианта ответа

Расположение стреловидного шва и малого родничка при 2-ой позиции задний вид

малый родничок слева сзади

малый родничок справа сзади

малый родничок справа спереди

стреловидный шов в левом косом размере

стреловидный шов в правом косом размере

131. Выберите 2 правильных варианта ответа

Расположение стреловидного шва и малого родничка при 1-ой позиции передний вид

малый родничок слева сзади

малый родничок слева спереди

малый родничок справа спереди

стреловидный шов в левом косом размере

стреловидный шов в правом косом размере

132. Выберите 2 правильных варианта ответа

Характерно для биомеханизма родов при заднем виде затылочного вставления

головке 2 точки фиксации

малый родничок

подзатылочная ямка

переносица

граница волосистой части

передний край большого родничка

133. Выберите 2 правильных варианта ответа

Прорезывание головки при заднем виде затылочного вставления соответствует моменту б/м родов

внутреннему повороту головки

дополнительному сгибанию головки

внутреннему повороту плечиков

разгибанию головки

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным

134. Выберите правильный вариант ответа
Наиболее рационально при неосложненных родах пересекать пуповину

- сразу после рождения ребенка
- после отделения последа
- после прекращения пульсации сосудов пуповины
- через 20 минут

135. Выберите правильный вариант ответа
Скобка на пуповину накладывается

- на границе кожи и пуповины
- на расстоянии 1-2 мм от границы кожи
- на расстоянии 3-5 мм от границы кожи
- на расстоянии 2 см от границы кожи

136. Выберите правильный вариант ответа
Профилактика гонобленореи у новорожденного проводится раствором

- 0,02% перманганата калия
- 3% соды
- 20% сульфацила натрия
- 0,02% фурацилина

137. Выберите правильный вариант ответа
Максимальная суммарная оценка новорожденного по шкале Апгар

- 9-10 баллов
- 12 баллов
- 8 баллов
- 2 балла

138. Выберите правильный вариант ответа
Новорожденный оценивается по шкале Апгар

- сразу после рождения
- в конце 1-й и 5-й минуты
- через 20 минут
- перед переводом в послеродовое отделение

139. Выберите 2 правильных варианта ответа

Оценку состояния по шкале Апгар проводят через

- 1 минуту
- 1 час
- 5 минут
- 2 часа
- 10 минут

140. Выберите 2 правильных варианта ответа

Использование шкалы Апгар позволяет

- оценить состояние новорождённого
- степень зрелости новорождённого

- установить показания к проведению реанимационных мероприятий
- определить массу тела новорождённого
- определить рост новорождённого

141. Выберите правильный вариант ответа

- Одним из показателей состояния новорожденных по шкале Апгар является
- срок беременности
 - масса тела
 - длина тела
 - цвет кожи

142. Выберите правильный вариант ответа
Оценка здорового новорожденного по шкале Апгар в баллах составляет

- 11-12
- 8-10
- 5-6
- 3-4

143. Выберите правильный вариант ответа
При осмотре кожи новорожденного в возрасте 5-и дней можно выявить

- яркую гиперемию кожи
- желтушное окрашивание кожи и слизистых
- повышенную потливость
- творожистую смазку

144. Выберите правильный вариант ответа
Появляется при нагрубании молочных желез у новорожденного (мастопатия)

- серозно-гнойное отделяемое из желез
- увеличение их до 2 см в диаметре
- повышение температуры тела до 38-39°C
- гиперемия кожи над железами

145. Выберите правильный вариант ответа
Можно при нагрубании молочных желез у новорожденного

- сцедить содержимое желез
- сделать полуспиртовый компресс
- наложить сухую стерильную повязку
- наложить повязку с мазью Вишневского

146. Выберите правильный вариант ответа
Физиологическая эритема это

- цианотичная окраска кожи
- гиперемия кожи
- желтушная окраска кожи
- появление пятен гиперемии, папул

147. Выберите правильный вариант ответа
Выделяется с мочой при мочекишечном инфаркте почек

- белок-альбумин

- глюкоза
- соли мочевой кислоты
- билирубин

148. Выберите правильный вариант ответа
Время появления желтушной окраски кожи при транзиторной желтухе

- первые часы жизни
- 2-3 день
- 7-10 день
- 10-14 день

149. Выберите правильный вариант ответа
Частота мочеиспусканий в сутки у новорожденного первых 3 дней жизни

- 20-25
- 15-20
- 10-15
- 4-6

150. Выберите правильный вариант ответа
Частота сердечных сокращений здорового доношенного новорожденного ребенка

- 60-80
- 80-100
- 120-140
- 140-180

151. Выберите правильный вариант ответа
Родовая опухоль - это

- кровоизлияние в полость черепа
- кровоизлияние под надкостницу
- обширное кровоизлияние в мягкие ткани головы
- отек кожи и подкожной клетчатки головы

152. Выберите правильный вариант ответа
При транзиторной желтухе в крови повышается уровень

- белка
- билирубина
- глюкозы
- холестерина

153. Выберите правильный вариант ответа
Отмечается у новорожденного физиологическая

- гипертония мышц-разгибателей
- гипертония мышц-сгибателей
- гипотония мышц-сгибателей
- нормотония мышц

154. Выберите правильный вариант ответа
Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности (нед.)

- 28-31
- 32-34
- 35-36
- 37-42

155. Выберите правильный вариант ответа

Средняя масса тела доношенного составляет (в г)

- 2000-2500
- 2500-3000
- 3000-3500
- 3500-4000

156. Выберите правильный вариант ответа
Пуповинный остаток отпадает на сроке (день жизни)

- 1-2
- 4-5
- 7-8
- 9-10

157. Выберите правильный вариант ответа
Снижение массы тела может происходить до (дни жизни)

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8

158. Выберите правильный вариант ответа
Физиологическое снижение массы тела новорожденного составляет не более (% к массе тела)

- 10
- 20
- 30
- 40

159. Выберите правильный вариант ответа
Половой криз у новорожденного проявляется

- повышением температуры тела
- увеличением массы тела
- увеличением грудных желез
- снижением температуры тела

160. Выберите правильный вариант ответа
Проявления мастопатии у новорожденного исчезают через

- 2-3 дня
- 2-3 недели
- 5-6 дней
- 5-6 недель

161. Температура воздуха в палате новорожденных должна быть (в град. С)

- 18-19
- 20-21
- 22-24
- 25-27

162. Выберите правильный вариант ответа
Период новорожденности называется

- фетальным
- интранатальным
- неонатальным

перинатальным

163. Выберите правильный вариант ответа
Масса тела доношенного новорожденного не менее (г)

- 2000
- 2500
- 3000
- 3500

164. Выберите правильный вариант ответа
Для комплексной оценки состояния новорожденного используется

- формула Молчанова
- срок беременности
- шкала Апгар
- масса и длина тела

165. Выберите правильный вариант ответа
Частота дыхательных движений у новорожденного

- 80-100
- 60-80
- 40-60
- 20-40

166. Выберите правильный вариант ответа
Частота стула в день у новорожденного к концу первой недели жизни

- 1-2
- 2-3
- 4-6
- 9-10

167. Выберите правильный вариант ответа
При ежедневном туалете новорожденного не проводится

- подмывание
- туалет пупочной ранки
- обработка кожных складок
- обработка слизистой полости рта

168. Выберите правильный вариант ответа
Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет (см)

- 30
- 40
- 50
- 60

169. Выберите правильный вариант ответа
Продолжительность физиологической эритемы у новорожденного составляет (дни)

- 1-3
- 3-5
- 5-6
- 7-8

170. Выберите правильный вариант ответа

Физиологическая желтуха у доношенного исчезает на сроке (дни жизни)

- 3-4
- 5-6
- 7-14
- 14-21

171. Выберите правильный вариант ответа
Для очищения носовых ходов новорожденного используют

- сухие ватные палочки
- ватные жгутики, смоченные стерильным маслом
- ватные шарики
- марлевые салфетки

172. Выберите правильный вариант ответа
Продолжительность гигиенической ванны для новорожденного составляет (мин)

- 1-4
- 5-7
- 10-15
- 15-20

173. Выберите правильный вариант ответа
Первичный патронаж новорожденного после выписки из роддома проводится

- в первый месяц
- в первую неделю
- в первые три дня
- в день выписки

174. Выберите правильный вариант ответа
Температура воды для гигиенической ванны новорожденного (град. С)

- 36-37
- 38-39
- 40-41
- 42-43

175. Выберите правильный вариант ответа
При туалете глаз здорового ребенка в домашних условиях используют

- 30% р-р сульфацила натрия
- 3% р-р перекиси водорода
- кипяченая вода
- 1:5000 р-р фурацилина

176. Выберите правильный вариант ответа
Восстановление первоначальной массы тела у здорового доношенного происходит (день жизни)

- 2-3
- 4-5
- 7-10
- 11-15

177. Выберите правильный вариант ответа
При физиологической желтухе новорожденных

- кал и моча остаются обычной окраски
- кал светлеет, моча темно-коричневого цвета
- печень и селезенка увеличиваются
- общее состояние нарушается

178. Выберите правильный вариант ответа

Пупочную ранку новорожденного обрабатывают раствором

- 2% бикарбоната натрия
- 3% перекиси водорода
- 5% йода
- 5% хлорида натрия

179. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность периода новорожденности (нед.)

- 1
- 4
- 6
- 12

180. Выберите правильный вариант ответа

Выберите 1 из показателей шкалы Апгар

- артериальное давление
- характер дыхания, крик
- масса и длина тела
- срок беременности

181. Выберите правильный вариант ответа

Ранний неонатальный период продолжается

- с момента рождения до 7 дней
- с момента рождения до 14 дней
- с момента рождения до 21 дня
- с 28 недели беременности до 7 дней жизни

182. Выберите правильный вариант ответа

Поздний неонатальный период продолжается

- с момента рождения до 28 дней
- с момента рождения до 7 дней
- с 8 до 28 дня жизни
- с 28 недели беременности до 7 дней жизни

183. Выберите правильный вариант ответа

Содержание гемоглобина у новорожденного в норме составляет (г/л)

- 140-170
- 170-240
- 110-120
- 120-140

184. Выберите правильный вариант ответа

Рекомендуется грудное вскармливание в родильном доме по

- режиму (часам)
- усмотрению врача-педиатра

усмотрению среднего медицинского персонала

«требованию» младенца

185. Выберите правильный вариант ответа
Ранняя профилактика заболеваний глаз у новорожденного (бленнореи) проводится раствором

- фурацилина 1:5000
- 0,9% хлорида натрия
- 20% сульфацила натрия
- перманганата калия 1:10 000

186. Выберите правильный вариант ответа

Оценку здорового новорожденного по шкале Апгар проводят

- через 10 минут после рождения
- на 1 и 5 минутах после рождения
- на 1 и 10 минутах после рождения
- на 5 и 10 минутах после рождения

187. Выберите правильный вариант ответа

Шкала Апгар включает следующее количество оценочных параметров

- 3
- 4
- 5
- 6

188. Выберите правильный вариант ответа

Введение вакцины БЦЖ детям осуществляется для профилактики

- дифтерии
- коклюша
- кори
- туберкулеза

189. Выберите правильный вариант ответа

Вакцинация против гепатита В проводится новорожденному на сроке (дни жизни)

- 1
- 2
- 3
- 4

190. Выберите правильный вариант ответа

Склонность новорожденных детей к срыгиванию обусловлена

- слабым развитием кардиального сфинктера
- хорошим развитием кардиального сфинктера
- слабым развитием пилорического сфинктера
- хорошим развитием пилорического сфинктера

191. Выберите правильный вариант ответа

При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают

- бифидобактерии
- кишечная палочка
- лактобактерии
- энтерококки

192. Выберите правильный вариант ответа
Первое после рождения прикладывание
здорового новорожденного к груди матери
проводят

- через 20 мин - 2 часа
- через 6 часов
- через 12 часов
- через 24 часа

193. Выберите правильный вариант ответа
Первый физиологический перекрест в
лейкоцитарной формуле происходит у
ребенка

- на 1-2 день жизни
- на 5-6 день жизни
- в 1-2 года
- в 5-6 лет

194. Выберите правильный вариант ответа
Емкость желудка доношенного
новорожденного составляет в мл

- 30-35
- 50-55
- 60-100
- 100-150

195. Выберите правильный вариант ответа
Вакцинация БЦЖ проводится здоровому
новорожденному на сроке (дни жизни)

- 1-3
- 3-7
- 8-12
- 13-18

**ПК 1.6. Применять лекарственные
средства по назначению врача**

196. Выберите 2 правильных варианта
ответа

Препараты, используемые для созревания
шейки матки

- окситоцин
- пропедил гель
- спленин
- простенон

197. Выберите правильный вариант ответа
Наркотические анальгетики

не применяются для обезболивания
родов

назначают для премедикации перед
операцией кесарева сечения

не угнетают дыхательный центр

вводятся только по назначению врача и
подлежат строгому учету

198. Выберите правильный вариант ответа
Ненаркотическим анальгетиком является

- дипидолор
- промедол
- морфин
- анальгин

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, медицинского страхования

199. Выберите правильный вариант ответа
Главным принципом в работе акушерки
является

- забота об имидже акушерки
- выполнение всех желаний роженицы
- внедрение хозрасчета и расширение
сферы услуг
- обеспечение безопасности материнства и
соблюдение прав пациента

200. Выберите правильный вариант ответа
Принципы работы женской консультации
изложены в приказе

- №5
- №572н
- №55
- №345

201. Выберите правильный вариант ответа
Принципы организации работы родильных
домов содержатся в приказе

- № 5

№ 572н

№ 43

№ 430

202. Выберите правильный вариант ответа

Медицинский персонал родильных домов
проходит флюорографическое
обследование

- ежеквартально
- 2 раза в год
- 1 раз в год
- 1 раз в 2 года

203. Выберите правильный вариант ответа

Персонал родильных домов должен
работать в маске

- на посту родового отделения
- на посту послеродового отделения
- при отделении последа
- при проведении ЛФК

204. Выберите правильный вариант ответа

Персонал родильных домов должен иметь прививки от

- дифтерии, гепатита В и туберкулёза
- оспы
- сифилиса
- гонореи

205. Выберите правильный вариант ответа
1 раз в день по СанПиН в послеродовом отделении меняется

- постельное бельё
- рубашки
- подкладные пелёнки
- пелёнки для кормления новорождённого

206. Выберите правильный вариант ответа
Безопасность материнства

- главная задача органов родовспоможения и его сотрудников
- личная проблема женщины
- не является проблемой семьи
- не является социальной проблемой.

207. Выберите правильный вариант ответа
Дородовый декретный отпуск выдается в

- 26 недель
- 28 недель
- 30 недель
- 32 недели

208. Выберите правильный вариант ответа
Послеродовый декретный отпуск при отсутствии осложнений составляет дней

- 56
- 70
- 86
- 140

209. Выберите правильный вариант ответа
Родильнице с двойней послеродовый декретный отпуск

- 70 дней
- 86 дней
- 110 дней
- 140 дней

Эталоны ответов на ПМ.01

ПК 1.1.:

1. однократно при постановке на учет
2. трижды за беременность
3. к каждой явке
4. кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоцитоз
5. 1 раз в 2 недели
6. необходим всем для оценки зрения и состояния сосудов глазного дна
7. не показана при желанной беременности
8. 3 раза за беременность
9. проводится только по желанию женщины
10. пороков развития плода
11. определение ХГЧ и плацентарного протеина; УЗИ

ПК 1.2.:

12. комплексы витаминов для беременных
13. как любые лекарственные средства, должны назначаться акушером
14. в родильном зале
15. в раннем репродуктивном возрасте
16. рекомендуется всем беременным для уменьшения болевых ощущений в родах
17. совместное пребывание матери и плода в отдельной палате со всеми удобствами
18. по его требованию
19. 1,5-2 месяца
20. укроп и фенхель

ПК 1.3.:

21. хлоргексидина глюконатом
22. кожей
23. 3-4см
24. кислая
25. Colpos
26. точечную
27. пролиферации
28. функционального слоя эндометрия
29. ампулярной части трубы
30. имплантация
31. повышается
32. многослойный плоский
33. кислая
34. коническая
35. пролиферации
36. щелочная
37. 3-7 дней
38. выход яйцеклетки из Граафова пузырька
39. прогестерон
40. яичнике
41. ампулярная
42. 25-28-31-21
43. 11 см
44. 12,5-13 см

45. диагональной
46. наружной
47. на боку с согнутой нижележащей ногой
48. трубе
49. имплантация
50. 1000 мл
51. плацентой
52. 12 см
53. 9,5 см
54. сомнительным
55. задержка месячных
56. выслушивание сердцебиения плода
57. хорионического гонадотропина
58. 1 кг
59. повышается
60. 300 г
61. повышены
62. тошнота и изменение вкуса
63. 280 дней
64. 18 недель
65. 22 недели
66. 24 недели
67. умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
68. 16 недель
69. 32 недели
70. 135 уд/мин
71. позицией
72. положением
73. предлежание и вид плода
74. 2
75. укорочение шейки до 1 см
76. положение; позицию и вид плода
77. 4-м приёмом Леопольда; методом Пискачека
78. нижним краем симфиза; седалищными буграми
79. наиболее выступающий край мыса; выступающий верхне-внутренний край симфиза
80. диагональной конъюгате; наружной конъюгате
81. высоты лона; индекса Соловьёва
82. извращение вкуса и обоняния; тошнота и рвота
83. пальпация частей плода; положительный тест на ХГЧ
84. КТГ; доплерометрия
85. мягкая; расположена по оси родового канала
86. наличие сформировавшейся родовой доминанты; наличие зрелой шейки матки
87. лобок; малые половые губы

88. влагалище; маточные трубы
89. матка; яичники
90. яйцеклетки; женские половые гормоны
91. лонная кость; седалищная кость
92. разрыв фолликула; выход яйцеклетки из фолликула
93. росту молочных желез; сохранению беременности
94. извращение вкуса и обоняния; тошнота и рвота
95. синюшность слизистой влагалища и шейки матки; отсутствие менструации
96. изменение величины матки; изменение формы и консистенции матки
97. 300 г; 400 г
98. средним косым размером
99. точкой фиксации
100. через 4-5 минут по 35 секунд
101. через 3 минуты по 50 секунд
102. полного раскрытия шейки
103. 5-6 см
104. термометрия
105. Альфельда
106. выпустить мочу катетером
107. предложить женщине потужиться
108. 12-16 часов
109. 0,5% от массы тела
110. 2 часа
111. 2 часа
112. всем женщинам
113. биомеханизмом родов
114. при отхождении околоплодных вод
115. в промежутках между каждой схваткой
116. на 3 поперечных пальца ниже пупка
117. 2-3 дня
118. на третьи сутки послеродового периода
119. через 3 недели
120. формированием родовой доминанты; формированием зрелой шейки матки
121. произвольностью, периодичностью и длительностью; силой сокращения и болезненностью
122. контракции и ретракции; дистракции
123. регулярными схватками 1-2 схватки за 10 минут; сглаживанием и раскрытием шейки матки
124. наличием схваток нарастающих по силе и частоте; сглаживанием и раскрытием шейки матки
125. ложные схватки; опущение дна матки
126. при полном открытии маточного зева; при почти полном открытии маточного зева
ПК 1.4.:

127. при прорезывании теменных бугров
128. уровень расположения головки в малом тазу
129. расположением родничков; расположением стреловидного шва
130. малый родничок справа сзади; стреловидный шов в правом косом размере
131. малый родничок слева спереди; стреловидный шов в правом косом размере
132. подзатылочная ямка; граница волосистой части
133. дополнительному сгибанию головки; разгибанию головки
ПК 1.5.:
134. после прекращения пульсации сосудов пуповины
135. на расстоянии 3-5 мм от границы кожи
136. 20% сульфацила натрия
137. 9-10 баллов
138. в конце 1-й и 5-й минуты
139. 1 минуту; 5 минут
140. оценить состояние новорождённого; установить показания к проведению реанимационных мероприятий
141. цвет кожи
142. 8-10
143. желтушное окрашивание кожи и слизистых
144. увеличение их до 2 см в диаметре
145. наложить сухую стерильную повязку
146. гиперемия кожи
147. соли мочевой кислоты
148. 2-3 день
149. 4-6
150. 120-140
151. отек кожи и подкожной клетчатки головы
152. билирубина
153. гипертония мышц-сгибателей
154. 37-42
155. 3000-3500
156. 4-5
157. 3-4
158. 10
159. увеличением грудных желез
160. 2-3 недели
161. 22-24
162. неонатальным
163. 2500
164. шкала Апгар
165. 40-60
166. 4-6
167. обработка слизистой полости рта